


FL  
15645

# ABC da Agricultura Familiar Alimentação das criações na seca 1

## Reservando pastos e forragem para uso na seca



Reservando pastos e forragens  
2004 FL - 15645



31771-1

# Apresentação

O lançamento da série ABC da Agricultura Familiar representa uma contribuição da Embrapa aos programas sociais do governo. As cartilhas foram criadas pela Embrapa Informação Tecnológica com o objetivo primordial de apoiar o esforço das famílias beneficiadas pelo programa Fome Zero para melhorar sua alimentação. Apresentam orientações tecnológicas simplificadas para aumentar a produção de alimentos nos quintais e em pequenas áreas, particularmente no Semi-Árido nordestino. As instruções são baseadas em publicações da Embrapa, de outras organizações de pesquisa agropecuária, do Sistema de Extensão e de organizações não governamentais.

Ao apresentar esse novo produto, esperamos estar demonstrando o empenho de nossa instituição em contribuir para a melhora da qualidade de vida de todas as camadas sociais da população brasileira.

Brasília, maio de 2004

Clayton Campanhola  
Diretor-Presidente da Embrapa

## Por que e como reservar pastos para corte?

- Você pode reservar pastos para serem cortados e fornecidos em cochos aos animais durante o período seco.
- Os melhores pastos para reservar são a **palma forrageira** e o **capim-elefante**.

## Palma-forrageira

- A palma deve ser cortada, picada ou "pinicada" à mão ou à máquina, antes de ser dada aos animais.
- Se a palma estiver muito verde, com muita água, ela pode ser cortada e seca na sombra por uma ou duas semanas. Com menos água, ela se conserva por mais tempo e o animal come mais.
- Você deve dar de 3 a 4 quilos de palma por dia para cada caprino ou ovino adulto.
- Para cada bovino adulto, dar de 20 a 30 quilos.
- Se a palma for pouca ou se você tiver outros volumosos (como capins, raspas, folhas e ramas de leucena ou de outras plantas), dê menos.



## Capim-Ellefante

- O **capim-elfeante** só deve ser plantado no "baixio", onde a terra é mais úmida.
- Não deixe o capim amadurecer demais ("envarar") para cortar. Ele fica muito pobre como alimento.
- Cortando, você aproveita a forragem de duas ou três produções por ano.
- Corte o **capim-elfeante** no início da floração. Deixe secar por um dia ao sol. Depois guarde como feno em montes (medas) ou fardos.



## Reservando forragem para colher ou apanhar

- As melhores forragens para colher ou apanhar são a melancia-de-cavalo e a algarobeira.



## Melancia-de-cavalo

- Você deve deixar a **melancia-de-cavalo** já madura no campo mesmo.
- Colher no período seco e dar aos animais à vontade, no cocho, picada ou apenas quebrada.
- Os animais também podem comer a melancia-de-cavalo diretamente no campo.
- Dar pelo menos uma revirada na melancia-de-cavalo, para a parte de baixo receber sol também.



## Algarobeira

- As vagens da **algarobeira** caem no chão durante a seca.
- Elas não devem ser usadas por muito tempo como alimento único dos animais, pois podem causar uma doença chamada "cara torta".
- Quando servir no cocho, colocar as vagens só como metade da mistura que for dada aos animais.
- Dar até meio quilo por cabeça por dia, para caprinos e ovinos, de preferência quebradas ou trituradas. Para bovinos dar até 3 quilos de vagens por cabeça e por dia.
- Durante as secas mais brabas, você pode derrubar as ramas da algaroba para dar aos animais.





## Por que e como reservar áreas para os animais pastarem?

- Você pode levar os animais para pastar nas áreas reservadas.
- Os pastos mais comuns para uso só no período da seca são o **capim-buffel** e o **pasto nativo (caatinga)**.
- Estes pastos são muito pobres na seca e agüentam poucos animais. Escolha os animais mais "fracos", que precisam de mais alimento.
- Quanto mais animais você deixar pastar nessas pastagens, mais depressa o pasto vai acabar.

## Capim-buffel

- Um pasto de 5 hectares de **capim-buffel** só dá para sustentar de 60 a 90 caprinos/ovinos (ou de 10 a 15 bovinos), por 30 dias, numa seca mais forte.



## Pasto de caatinga

- Um pasto de **caatinga** sustenta muito menos que um pasto de capim-buffel.



### Atenção, muito importante!

- Não deixe, de forma alguma, os animais "rasparem" ou "pelarem" os pastos reservados. Fica muito caro fazer o seu replantio ou recuperação.
- Deixe um resto cobrindo o chão. Isso vai evitar o trabalho de replantio quando chegarem as chuvas.
- O pasto vai se recuperar mais rapidamente.



## Atenção!

Para outras informações e esclarecimentos, procure um técnico da Extensão Rural, da Embrapa, da Prefeitura ou de alguma organização de assistência aos agricultores.

### Forme uma associação com seus vizinhos

- A união faz a força!
- Quando você se associa com os outros membros de sua comunidade, fica mais fácil conseguir as coisas.
- Fica mais fácil procurar as autoridades e pedir apoio para seus projetos.
- Fica mais fácil obter crédito para melhorar sua produção e sua casa.
- Os associados podem vender seus produtos em conjunto.
- É possível comprar máquinas e aparelhos em conjunto - como uma picadora de forragem por exemplo (cada família ajuda com uma parte do custo).
- Os associados podem organizar mutirões.
- A associação pode organizar uma pequena farmácia com remédios e suplementos para os animais.
- Procure o Comitê Local do Fome Zero para ajuda na organização da Associação.



**Autor da cartilha:** Méd.Vet. Clovis Guimarães Filho, M.Sc.

**Fotos:** Clovis Guimarães Filho.

**Equipe Editorial:** Méd.Vet. Clovis Guimarães Filho, Prof<sup>a</sup>. Milena Ambrosio Telles, Engs. Agrs. Raul Colvara Rosinha e Roberto Vicente Cobbe - CW Produções Ltda.